

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

Πανεπιστημίου 334
ΤΚ: 26443 ΠΑΤΡΑ, ΤΘ: 2459 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610.224.629
Fax: 2610.623.238
Email: pkpfpatr@otenet.gr

ΑΧΑΪΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΙΘΑΚΗΣ

Πληροφορίες: Ευαγγελία Σακκούλη

ΚΕ: 2/8-5-14

ΚΕΡΑΣΙΑ

ΡΑΓΟΛΕΤΗΣ:

Rhagoletis cerasi (κν.σκουλήκι των κερασιών, μύγα των κερασιών)

Διαπιστώσεις: Τα κεράσια είναι επιδεκτικά προσβολής όταν αρχίζουν να αλλάζουν χρώμα, από κίτρινο σε ρόδινο. Η ζημιά που προκαλείται είναι πολύ σοβαρή, ιδιαίτερα στα επιτραπέζια κεράσια. Οι πρώιμες ποικιλίες είναι ανθεκτικότερες στην προσβολή από το έντομο.

Συστάσεις: Στις πρώιμες ποικιλίες που συνήθως δεν προσβάλλονται από το Ραγολέτη δεν χρειάζεται καμιά επέμβαση.

Στις όψιμες ποικιλίες να γίνει καταπολέμηση του εντόμου με κατάλληλο εντομοκτόνο σκεύασμα στο στάδιο έναρξης αλλαγής χρώματος καρπού.

Στις βιολογικές καλλιέργειες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σκεύασμα **Μποβέρια Μπασιάνα** μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής.



Ενήλικα *Rhagoletis cerasi* (φωτ. Ε. Σακκούλη)



Προσβολή από Ραγολέτη σε κεράσι
Πηγή: <http://greensupport.gr>



Προνύμφη Ραγολέτη μέσα σε κεράσι

ΜΟΝΙΛΙΑ (Φαιά σήψη):

- Συμπτώματα: Ο μύκητας μπαίνει από τα σκασίματα που προκαλούνται από ακανόνιστα ποτίσματα, έντονη βροχόπτωση μετά από περίοδο ξηρασίας ή χαλάζι.
- Συστάσεις: **Να σταματούν τα ποτίσματα μερικές ημέρες πριν τη συγκομιδή.**
Να γίνει προληπτικός προστατευτικός ψεκασμός τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη συγκομιδή.
- Φάρμακα: *Στις λίστες των μυκητοκτόνων και εντομοκτόνων.*

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να τηρούνται σχολαστικά τα όρια των ψεκασμών πριν από τη συγκομιδή, για να μην υπάρχουν υπολείμματα φαρμάκων στους καρπούς.

ΣΗΜ.1: Ακολουθείτε τις οδηγίες των φαρμάκων.

ΣΗΜ.2: Όλα τα δελτία υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Internet (www.minagric.gr).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π. ΟΡΦΑΝΟΣ
MSc/MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ